

د) معدّلات المزاج – Thymorégulateur

لها خاصة معدّلة للمزاج ، توصف هذه الأدوية لعلاج الاضطرابات ثنائية القطب (Troubles bipolaires) ، أهم دواء مستعمل هو Neurolithium^R ، إذ يعتبر العلاج المرجعي و يحتاج توزيعه إلى عناية خاصة نظرا لكثرة و خطورة أعراضه الجانبية.

العلاج بالليثيوم (Lithiémie) يكون في الصباح قبل الإفطار ، 12 ساعة بعد ، كل خمسة أيام ، ثم كل شهر ، ثم كل ثلاثة أشهر.

1- الأعراض الجانبية - Les effets indésirables :

كثيرة ، معتادة ، ولكن يمكن التحكم فيها أي تصحيحها.

1-1- أعراض نفسية عصبية (Neuropsychiques):

- رجفة اليدين ، تصحح ب: Avlocardyl^R .
- دواخ عابر ، خاصة في بداية العلاج.
- اضطراب الذاكرة
-

1-2- أعراض غددية:

- زيادة الوزن
- قصور الغدة الدرقية (Hypothyroïdie)

1-3- أعراض مختلفة:

- اضطرابات جلدية (Acné)
- زيادة العطش مع زيادة تواتر التبول الليلي

1-4- اضطراب القلب:

- أعراض فرط الجرعة: الغثيان ، الرجفة ، العطش ، اضطراب التوازن ، Syndrome polyurique
- يمنع الاستعمال في حال الفشل الكلوي : Créatinémie كل ستة أشهر.

يعوض الليثيوم في الجزائر ب: Valpromide- Depamide^R

- يستعمل لتخفيف العدوانية
- ينصح بالاستعمال التدريجي
- له أعراض جانبية قليلة: إضطرابات عصبية نفسية وهضمية حميدة.

أوباستعمال Carbamazepine-Tegretol^R (الأكثر استخداما)

- مضاد للصرع، الإضطرابات ثنائية القطب، ألم الوجه العصبي (Névralgie faciale)
- له أعراض جانبية شائعة: نفسية عصبية، حساسية، تضرر الكبد (Toxicité du foie).